

RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DE TAMARANA

EMPREGO PÚBLICO

MÉDIO

TARDE

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

CARGO ENFERMEIRO ESF (PSF)

QUESTÃO 26 – MANTER

Justificativa: Conforme: INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE AO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO, Secretaria de Vigilância em Saúde, pag. <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/marco/22/Instrucao-Normativa-Calendario-Vacinacao-Site.pdf>

Vacina BCG

Esquema:

Administrar dose única, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento.

Dose:

Laboratório FAP: 0,1mL via intradérmica.

Laboratório Serum Institute of India: 0,05mL em crianças recém-nascidas até 11 meses e 29 dias e 0,1mL para pessoas a partir de 1 (um) ano de idade, via intradérmica.

Particularidades:

A comprovação da vacinação com BCG é feita por meio do registro da vacinação no cartão ou caderneta de vacinação, da identificação da cicatriz vacinal ou da palpação de nódulo no deltoide direito, na ausência de cicatriz. Em crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, adiar a vacinação até que atinjam este peso. Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal não necessitam ser revacinadas. Esta vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas. Em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico.

Contatos prolongados de portadores de hanseníase:

vacinação seletiva, nas seguintes situações:

Menores de 1 (um) ano de idade:

- Não vacinados: administrar 1 (uma) dose de BCG;
- Comprovadamente vacinados que apresentem cicatriz vacinal: não administrar outra dose de BCG.
- Comprovadamente vacinados que não apresentem cicatriz vacinal: administrar 1 (uma) dose de BCG 6 (seis) meses após a última dose.

A partir de 1 (um) ano de idade:

- Sem cicatriz: administrar 1 (uma) dose;
- Vacinados com 1 (uma) dose: administrar outra dose de BCG, com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a dose anterior;
- Vacinados com 2 (duas) doses: não administrar outra dose de BCG. Pessoas expostas ao HIV:
- Criança que chega ao serviço, ainda não vacinada, poderá receber BCG se assintomática e sem sinais de imunodepressão.
- A partir dos 5 (cinco) anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência.

QUESTÃO 33 – MANTER

Justificativa: Conforme, Coleção Praxis Enfermagem 4, Semiologia Bases para a Prática Assistencial, pg. 98

Tipos de dor torácica:

- Contínua,
- Aperto com pressão,
- Em pontada e contínua,
- Lancinante e cortante,
- Súbita e intensa,
- Dor surda, em pressão e aperto,
- Em queimação,
- Dor em cólica, aguda,
- Em pontada, contínua ou intermitente,
- Dor surda ou em pontada.

Conforme o enunciado da questão que pede para marcar a única alternativa errada, somente a letra A está incorreta, pois Cheyne-Stokes se refere a um tipo de respiração anormal.

QUESTÃO 35 - MANTER

Justificativa: Conforme, Coleção Praxis Enfermagem 4, Semiologia Bases para a Prática Assistencial, pg. 175

- Ruídos intestinais aumentados – altos, agudos e frequentes, indicando aumento da mobilidade intestinal.
- Ruídos intestinais diminuídos – frequência diminuída, associados a íleo, obstrução intestinal ou peritonite, indicando peristaltismo diminuído.
- Ruídos de fricção sobre o fígado e baço.
- Sopros abdominais.

Portanto a única alternativa que não está correta, é a letra A.